Aquitaine Mucoviscidose

# Protocole d'hygiène

***Rappel des statuts bactériologiques :***

➔ ***Classe 1*** *: Bactéries saprophytes et sensibles à la plupart des antibiotiques ( Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus sensible, Streptococcus pneumoniae)*

➔ ***Classe 2*** *: Pseudomonas aeruginosa sensible à la plupart des antibiotiques,*

➔ ***Classe 3*** *: Bactéries multi-résistantes telles que Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, P. aeruginosa résistant aux céphalosporines de 3e génération ou à l'imipénème, Stenotrophomonas maltophilia et Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxydans,*

➔ ***Classe 4*** *: Burkholderia cepacia naturellement multi-résistant et très pathogène dans la mucoviscidose.*

## Précautions standard

### Mesures générales

• Ne pas faire attendre le patient en salle d'attente.

• Prendre le patient en premier dans la journée, ou après désinfection des surfaces (table d'examen, stéthoscope, saturomètre) et aération du local.

• Lavage des mains avant et après les soins au savon liquide et essuyage avec essuie-mains jetables et/ou désinfection à la solution hydro-alcoolique.

• Le port d'une surblouse (ou d'un vêtement spécifique) réservée à un seul patient est systématique.
Elle est lavée par la famille après chaque passage du thérapeute si le traitement a lieu à domicile. En cas de soins au cabinet, la surblouse doit être lavée régulièrement.

• Le port de masque est recommandé. Il est systématique en cas d'infection des voies aériennes du thérapeute (masque de type chirurgical). Le port de lunettes permet de protéger le thérapeute des risques de projection.

• Si plusieurs patients atteints de mucoviscidose doivent être examinés, commencer si possible par celui qui a le statut bactériologique le moins élevé.

### Désinfection des surfaces et du matériel :

• Désinfection des surfaces entre chaque patient avec une solution de détergent-désinfectant et une chiffonnette à usage unique.

• Le petit matériel (stéthoscope, saturomètre…) doit être nettoyé entre chaque patient. Ce nettoyage peut se faire avec une lingette à usage unique imprégnée de détergent-désinfectant.

## Précautions spécifiques pour les patients porteurs de micro-organismes de classe 3 ou 4

• En plus des recommandations générales, le port d'un masque par le soignant est systématique. Sa surblouse devra être lavée après chaque utilisation.
• Le soignant devra organiser la prise en charge de ces patients en fin de journée, dans la mesure du possible.