

Fiche de transmission

Kinésithérapeute - Médecin

Date : / /



L'enfant âgé de a bénéficié
d'une rééducation respiratoire pour encombrement bronchique.

Compte tenu des éléments du bilan kinésithérapique, j'adresse cet enfant :

Aux urgences pédiatriques :

- Signes d'hypercapnie et/ou d'épuisement et/ou d'atteinte virale cérébrale :
apnées > 8 secondes, troubles du tonus et de la vigilance, geignement expiratoire, fréquence
respiratoire < 20 / min
- Signes d'hypoxie : cyanose péri-buccale et des extrémités, teint gris, pâleur extrême, SpO2
< 94% sous air au repos
- Fréquence respiratoire > 60/min
- Balancement thoraco-abdominal de type 2
- Mauvaise tolérance de la kinésithérapie respiratoire

Au médecin prescripteur ou à un médecin de garde :

- Difficultés alimentaires : ration <50% (sur au moins 2 repas), vomissements,
diarrhées, douleurs abdominale
- Signes de lutte : battement des ailes du nez, balancement thoraco adominal de type 1, entonnoir
xiphoïdien, tirages
- Fréquence cardiaque (au saturomètre) : < 40 ou > 160 bat / min
- Suspicion de RGO pathologique : régurgitation/inhalation pendant la séance, toux rauque,
post-prandiale, nocturne, au change...
- Signes infectieux : température > ou = à 38.5° pendant plus de 48 heures (critère
d'antibiothérapie)
- Persistance de l'encombrement bronchique: anormal si >> 10 jours, renouvellement prescription
- Majoration du bronchospasme après la séance (nécessite un traitement broncho dilatateur avant la
séance)

Commentaires :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cachet et signature :

.....